


Encéphalite japonaise (EJ)



Vecteur

Piqûre d'un moustique infecté, principalement du genre *Culex*³²



67 900 cas

par année à l'échelle mondiale (estimation)³²



Symptômes: Fièvre, frissons, céphalées, douleur musculaire, confusion mentale, spasmes au cou et à la colonne vertébrale et faiblesse musculaire³²



Cas grave: Invalidité neurologique, psychosociale, intellectuelle ou physique chez environ de 30 à 50 % des personnes qui survivent à une atteinte grave; décès^{31,32}

- Des précautions contre l'encéphalite japonaise, incluant d'éviter les piqûres de moustiques et la vaccination devraient être considérés:
 - Prendre des mesures préventives lorsque les moustiques sont le plus actifs, et particulièrement entre le coucher et le lever du soleil⁷
 - Employer un insectifuge recommandé, contenant de l'icardine (à 20 %) ou du DEET^{7,8}
 - Porter des vêtements adéquats (chandails à manche longue, pantalons, etc.)⁷

Faits

Le virus de l'EJ est la première cause d'encéphalite virale en Asie⁹⁴

Elle est habituellement asymptomatique, bien que, lorsque la maladie clinique se manifeste, le taux de mortalité atteint de 20 à 30%; de 30 à 50 % des personnes qui survivent à une atteinte grave présenteront des séquelles neurologiques, cognitives ou psychiatriques^{31,32}