


Fièvre jaune



Faits

Fièvre jaune^{84,85}:

«Jaune» fait référence à la jaunisse (ictère) présentée par certains patients

Virus endémique et épidémique par intermittence dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud

Infection se distinguant des autres maladies transmissibles, du fait que son contrôle est assujetti au Règlement sanitaire international (RSI)

- Le RSI stipule que les voyageurs qui se rendent dans certains pays doivent présenter une preuve de vaccination contre la fièvre jaune

De 20 à 50% des personnes atteintes d'un cas grave peuvent en mourir^{84,86}



Vecteur

Piqûre d'un moustique infecté, principalement des espèces des genres *Aedes* et *Haemagogus*⁸⁴



D'après une étude de modélisation,

jusqu'à 170 000 cas graves

à l'échelle mondiale (estimation de 2013)⁸⁴



Symptômes: Fièvre, douleur musculaire, notamment dorsalgie, céphalées, frissons, perte d'appétit, nausées ou vomissements^{84,86}

Chez la majorité des patients, l'état s'améliore à la suite de la manifestation initiale. Après une brève rémission, allant de quelques heures à une journée, environ 15 % des patients entrent dans une phase plus grave ou toxique de la maladie⁸³

Cas grave: Forte fièvre accompagnée d'une atteinte hépatique et rénale, ictère, urine foncée, douleur abdominale, vomissements, saignements dans la bouche, le nez, les yeux ou l'estomac, et éventuellement choc et défaillance multiviscérale^{83,84}



- Des précautions contre la fièvre jaune, incluant d'éviter les piqûres de moustique et la vaccination, devraient être considérés⁸⁷:
 - Selon la destination, un certificat de vaccination peut être exigé⁸⁴
 - Prendre des mesures préventives lorsque les moustiques sont le plus actifs (durant la journée)⁷
 - Tout diagnostic de fièvre jaune posé au Canada doit être signalé aux autorités en santé publique⁸⁵
 - Employer un insectifuge recommandé, contenant de l'icardine (à 20 %) ou du DEET^{7,8}
 - Porter des vêtements adéquats (chandails à manche longue, pantalons, etc.)⁷
 - Utiliser des barrières physiques, telles que des moustiquaires de lit et de fenêtre⁷
 - Dans les jours suivant la manifestation de la maladie, on doit prévenir toute nouvelle exposition du patient infecté aux piqûres de moustique, afin d'éviter d'entretenir le cycle de transmission⁸³